



## Brush-Up Stochastik - Übungsblatt 4

Besprechung: 10. April im Kurs.

### 1 Parameterschätzung

#### Aufgabe 1

Nachdem die Firma "Spiel- und Spaßautomaten" in den letzten Jahren einen Rekordumsatz mit ihren Glühwein- und Crêpes-Automaten auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt erzielt hat, soll in diesem Jahr das Angebot um einen Feuerwurst-Automaten ergänzt werden. Dabei kann man die Wurst mit Senf oder Zaziki bestellen. Da das eigentliche Fachgebiet von "Spiel- und Spaßautomaten" die Herstellung von Glücksspielautomaten ist, wurde der Feuerwurst-Automat mit einem Zufallsgenerator ausgestattet. Eine Feuerwurst mit Senf aus dem Automaten kostet 3€, eine mit Zaziki 4.50€. Beim Einwurf der Summe bekommt man entweder die gewählte Wurst, gar keine oder eine Wurst mit Senf und Zaziki. Du lässt dir fünf mal hintereinander eine Feuerwurst mit Senf aus dem Automaten und notierst dabei den entsprechenden Gewinn in Euro mit  $X$ , d.h.  $X \in \{-3, 0, 1.5\}$ <sup>1</sup>. Das Ergebnis deiner Versuche ist  $(1.5, -3, 0, -3, 0)$ . Mit Hilfe dieser Daten versuchst Du herauszufinden wie  $X$  verteilt ist.

- Wie würdest Du die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ergebnisse bestimmen, wenn Du keine weitere Information über die Form der Zähldichte hättest?
- Du willst es nun genau wissen und wirfst einen Blick auf die Homepage von "Spiel- und Spaßautomaten". Dabei findest du heraus, dass  $X$  die folgende Zähldichte besitzt:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3p/2 & \text{falls } x = -3 \\ p & \text{falls } x = 0 \\ 1 - 5p/2 & \text{falls } x = 1.5 \end{cases},$$

wobei  $p \in (0, 2/5)$ . Konstruiere einen Schätzer für  $p$  gemäß der Momentenmethode aufgrund der vorliegenden Daten.

- Berechne  $\mathbb{P}_p(X_1 = 1.5, X_2 = -3, X_3 = 0, X_4 = -3, X_5 = 0)$  also die Wahrscheinlichkeit, dass die vorhandene Stichprobe auftritt) unter der Annahme, dass der Gewinn wie in (b) angegeben verteilt ist. Für welchen Wert von  $p$  wird diese Wahrscheinlichkeit maximal? Skizziere für diesen Wert von  $p$  die Verteilungsfunktion von  $X$ .

#### Aufgabe 2

Die Firma "ShineBright" ist Hersteller hochwertiger Leuchtmittel. Neu im Sortiment ist Die LED-Lampe "Helle Freude". Um ihr Produkt bewerben zu können, möchte "ShineBright" die mittlere Brenndauer (in Stunden) ihrer LED-Lampen anhand einer erhobenen Stichprobe  $(x_1, \dots, x_n)$  bestimmen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Beobachtung einer Zufallstichprobe  $(X_1, \dots, X_n)$  zur Exponentialverteilung mit Parameter  $\lambda > 0$  handelt.

<sup>1</sup>Bekommst du keine Wurst ist der Gewinn 3€, bei einer Wurst mit Senf 0€ und wenn du eine Wurst mit Senf und Zaziki bekommst beträgt der Gewinn 1.50€.

- (a) Bestimme den ML-Schätzer für den Erwartungswert  $1/\lambda$ .
- (b) Bestimme einen Momentenschätzer für den Erwartungswert  $1/\lambda$ .
- (c) Bei einer Überprüfung von 10 der neuen Lampen ergaben sich für die Brenndauern die Werte (9512.74, 16586.10, 13091.19, 7548.20, 3352.39, 342.27, 11681.13, 8795.62, 2800.88, 583.09). Bestimme die Werte der Schätzer aus (a) und (b) für diese Stichprobe.

### Aufgabe 3

$X_1, \dots, X_n$  sei eine Zufallsstichprobe der diskreten Verteilung mit folgender Zähldichte:

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \left(\frac{\theta}{2}\right)^{x^2} (1-\theta)^{1-x^2} & \text{falls } x \in \{-1, 0, 1\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Über den Parameter  $\theta$  ist lediglich bekannt, dass er positiv und kleiner 1 ist.

- (a) Stelle sicher, dass es sich bei  $f_\theta$  tatsächlich um eine Zähldichte handelt.
- (b) Zeige, dass die Ableitung der log-Likelihoodfunktion nach  $\theta$  durch

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \frac{n}{\theta} \hat{m}_2 - \frac{n}{1-\theta} (1 - \hat{m}_2)$$

gegeben ist und konstruiere einen Maximum-Likelihood-Schätzer für  $\theta$ . Hierbei sei  $\hat{m}_2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2$ .

### Aufgabe 4

Aus Erfahrung sei bekannt, dass die Brenndauer einer Glühbirne einer bestimmten Sorte durch eine absolutstetige Zufallsvariable  $X$  mit Dichte  $\rho_\theta(x) = 2\theta x e^{-\theta x^2} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$  beschrieben werden kann, wobei  $\theta > 0$  ein unbekannter Parameter ist.

- (a) Bestimme den Maximum-Likelihood-Schätzer für  $\theta$ .
- (b) Zeige, dass  $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\theta}}$ .
- (c) Bestimme einen Momentenschätzer für  $\theta$ .
- (d) Zeige, dass die Schätzer aus (a) und (c) konsistent<sup>2</sup> sind für  $\theta$ .
- (e) Die folgende Tabelle zeigt 15 Brenndauern (in 1000 Stunden) der Glühbirnen die in unabhängigen Versuchen ermittelt wurden.

1.530	1.173	1.832	1.075	1.539
0.998	2.083	0.693	2.529	1.639
1.325	1.487	1.298	1.743	1.432

Welche Ergebnisse liefern die Schätzer aus (a) und (c) für diese Daten?

### Aufgabe 5

Es sei  $(X_1, \dots, X_n)$  eine Zufallsstichprobe zur Bernoulli-Verteilung mit Parameter  $p \in [0, 1]$ . Betrachte die folgenden Schätzer für  $p$ :

$$\hat{p}_1(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n, \quad \hat{p}_2(X_1, \dots, X_n) = X_n.$$

Untersuche die beiden Schätzer hinsichtlich der Güteeigenschaften (asymptotische) Erwartungstreue und (schwache) Konsistenz.

<sup>2</sup>Es darf ohne Beweis verwendet werden, dass  $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{\theta}$ .