Partition Modelling

Sebastian Keim, Benedikt Jahn

Seminar „Stochastische Geometrie und ihre Anwendungen -
Zufällige Netzwerke“, 2008

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Beispiel aus der Schadenversicherung - der Orkan Kyrill

Quelle: Münchner Rück

Bilanz des Orkans (18. Januar 2007)

Der Orkan Kyrill verursachte einen Schaden von ca. 6 Milliarden Euro

- ⇒ große Risiken für Schadenversicherer
- ⇒ Modellierung von Risiken

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell**
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Das kollektive Modell der Schadenversicherungsmathematik:

Voraussetzungen:

- Sei N die zufällige Anzahl der Schäden innerhalb der Periode t
- Seien die Schadenhöhen $\{U_i : i \in \mathbb{N}\}$ unabhängig und identisch verteilt
- $U_i > 0$ f.s.
- Seien $\{U_i : i \in \mathbb{N}\}$ und N voneinander unabhängig

Gesamtschaden im kollektiven Modell

$$X^{col} = \sum_{i=1}^N U_i \quad (1)$$

Kritik am kollektiven Modell:

Beide Unabhängigkeitsannahmen sind in der Realität problematisch:

- Schäden U_i sind korreliert, da sie gemeinsame Risikofaktoren haben (z.B. das Wetter in der Autoversicherung)
- Schäden U_i sind mit der Schadenanzahl N korreliert (z.B. Elementarschaden Versicherung)

Kritik am kollektiven Modell:

Beide Unabhängigkeitsannahmen sind in der Realität problematisch:

- Schäden U_i sind korreliert, da sie gemeinsame Risikofaktoren haben (z.B. das Wetter in der Autoversicherung)
- Schäden U_i sind mit der Schadenanzahl N korreliert (z.B. Elementarschaden Versicherung)

⇒ Verwende ein Modell, das räumliche Abhängigkeitsstrukturen beachtet

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling**
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling**
 - **Problemstellung**
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Problemstellung:

Seien die Zielwerte $y_1, \dots, y_k$ (Höhe der mittleren Schadenzahlungen in einem PLZ Gebiet) an den Positionen $x_1, \dots, x_k$ gegeben:

Das Modell:

$$y(x_i) = \bar{y} + z(x_i) + \epsilon_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

wobei

- $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$
- $E(\epsilon_i) = 0, \text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$
- $z(x)$ ist eine deterministische Funktion, die die Abweichung des lokalen Mittelwerts vom globalen empirischen Mittelwert $\bar{y}$ beschreibt

Das Modell:

$$y(x_i) = \bar{y} + z(x_i) + \epsilon_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

wobei

- $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$
- $E(\epsilon_i) = 0, \text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$
- $z(x)$ ist eine deterministische Funktion, die die Abweichung des lokalen Mittelwerts vom globalen empirischen Mittelwert $\bar{y}$ beschreibt

Schätze $z(x)$ mit Hilfe der Daten $D = \{y_i, x_i\}_{i=1}^n$

Jedoch gilt für $\tilde{z}(x)$

Entweder höhere Varianz oder höherer Bias von $\tilde{z}(x)$:

Denn für den Mean squared error gilt:

$$MSE(\tilde{z}(x), z(x)) = E(\{(z(x) - \tilde{z}(x))^2\}) = \text{var}(\tilde{z}(x)) + \text{bias}(\tilde{z}(x))^2 \quad (2)$$

⇒ Es muss ein Kompromiss gefunden werden

Je näher zwei Positionen x_1 und x_2 beieinander liegen, desto stärker sind sie (positiv) korreliert

Hat x_1 einen großen Zielwert y_1 , so sollte der Zielwert y_2 bei x_2 ebenso relativ groß sein.

Je näher zwei Positionen x_1 und x_2 beieinander liegen, desto stärker sind sie (positiv) korreliert

Hat x_1 einen großen Zielwert y_1 , so sollte der Zielwert y_2 bei x_2 ebenso relativ groß sein.

- Erster Ansatz: Feste Korrelationsstruktur
(Korrelationsfunktion: $C(h) = Cov(y(x+h), y(x))$)
- Große Einschränkung: Einige Modelle können auf diese Weise nicht dargestellt werden

Je näher zwei Positionen x_1 und x_2 beieinander liegen, desto stärker sind sie (positiv) korreliert

Hat x_1 einen großen Zielwert y_1 , so sollte der Zielwert y_2 bei x_2 ebenso relativ groß sein.

- Erster Ansatz: Feste Korrelationsstruktur
(Korrelationsfunktion: $C(h) = Cov(y(x+h), y(x))$)
- Große Einschränkung: Einige Modelle können auf diese Weise nicht dargestellt werden
- Anderer Ansatz, ohne die Korrelationsstruktur explizit zu bestimmen

⇒ Partition Modeling

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling**
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik**
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Das Voronoi Mosaik:

Das Voronoi Mosaik:

Sei folgende Zerlegung von χ gegeben:

Disjunkte Gebiete $R_1, \dots, R_k$, deren Vereinigung den gesamten Raum ergeben. (d.h. $R_i^o \cap R_j^o = \emptyset$, $i \neq j$ und $\bigcup_1^k R_i = \chi$)

$$R_i = \{x \in \chi : D(x, c_i) \leq D(x, c_j)\}, i \neq j$$

- Die Zentren $c = (c_1, \dots, c_k)$ der Gebiete legen das Mosaik von χ eindeutig fest.
- Verwende den euklidischen Abstand
$$D^2(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^p (x_{1i} - x_{2i})^2 \quad (p=2 \text{ oder } p=3)$$

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling**
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model**
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Partition Model:

In jeder Region R_i ist die Zielwert-Funktion $z(x) = \mu_i \forall x \in R_i$

⇒ Jedoch eventuell hoher Bias und niedrige Varianz

Verbesserungen:

- Berücksichtige die Daten: Lege mehr Zentren an Positionen mit hoher Variabilität und weniger Zentren an Positionen, an denen die Funktion relativ flach ist.

Verbesserungen:

- Berücksichtige die Daten: Lege mehr Zentren an Positionen mit hoher Variabilität und weniger Zentren an Positionen, an denen die Funktion relativ flach ist.
- Betrachte die gewichtete Summe von Partition Models:

$$\tilde{z}(x) = \sum_{j=1}^J \omega^{(j)} \tilde{z}^{(j)}(x|c^{(j)}) \quad (3)$$

wobei J die Anzahl der Partition Models und $\sum_{j=1}^J \omega^{(j)} = 1$

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling**
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer**
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Bayes Schätzer

Wir nutzen die Daten $D = \{y_i, x_i\}_{i=1}^n$ als Update des Parameter(vektors) θ in einem parametrischen Modell

Nach dem Theorem von Bayes gilt:

$$p(\theta|D) = \frac{p(D|\theta)p(\theta)}{\int p(D|\theta)p(\theta)d\theta} \quad (4)$$

wobei

- $p(\theta)$ a priori Verteilung
- $p(D|\theta)$ Likelihood Funktion
- $p(\theta|D)$ a posteriori Verteilung

Bayes Schätzer

Wir nutzen die Daten $D = \{y_i, x_i\}_{i=1}^n$ als Update des Parameter(vektors) θ in einem parametrischen Modell

Nach dem Theorem von Bayes gilt:

$$p(\theta|D) = \frac{p(D|\theta)p(\theta)}{\int p(D|\theta)p(\theta)d\theta} \quad (4)$$

wobei

- $p(\theta)$ a priori Verteilung
- $p(D|\theta)$ Likelihood Funktion
- $p(\theta|D)$ a posteriori Verteilung

Die Berechenbarkeit des Integrals hängt von der a priori Verteilung ab
 $\Rightarrow$ Verwende konjugierte a priori Verteilung (a priori Verteilung und a posteriori Verteilung gehören zur selben Verteilungsfamilie)

Hierarchischer Bayes Schätzer:

Zerlegt die a priori Verteilung in bedingte Verteilungen:

$$p_1(\theta|\theta_1), p_2(\theta_1|\theta_2), \dots, p_n(\theta_{n-1}|\theta_n) \quad (5)$$

mit

$$p(\theta) = \int_{\Theta_1 \times \dots \times \Theta_n} p_1(\theta|\theta_1) p_2(\theta_1|\theta_2) \dots p_{n+1}(\theta_n) d\theta_1 \dots d\theta_{n+1} \quad (6)$$

⇒ Steigert die Robustheit des Schätzers

Ziel

Predictive Inference

Bestimme $p(y|x, D)$

Wie hoch ist der
Schaden y an einer
Position x ?

Vorgehensweise im Partition Model:

- Was ist gegeben, was gesucht?
- a priori Verteilung
- Likelihood-Funktion
- Marginal Likelihood

Im Partition Model:

Gegeben sind die Daten $D = \{y_i, x_i\}_{i=1}^n$

Im Partition Model:

Gegeben sind die Daten $D = \{y_i, x_i\}_{i=1}^n$

Im Modell sind folgende Parameter unbekannt:

- Die Lage der Zentren $c = (c_1, \dots, c_k)$
- $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_k)$
- Die Länge k der Vektoren c und μ
- Regressionsvariable σ^2

Die a priori Verteilung:

Hierarchischer Bayes Schätzer: Zerlegt die a priori Verteilung in bedingte Verteilungen

$$p(\theta) = p(k, c, \mu, \sigma^2) = p(\mu|c, \sigma^2)p(\sigma^2)p(c|k)p(k) \quad (7)$$

Wir wählen:

$$p(k) = \frac{1}{K}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$p(c|k) = \frac{1}{\{\text{Area}(\tau)\}^k}, \quad c \in \tau^k \quad (9)$$

Die a priori Verteilung:

Hierarchischer Bayes Schätzer: Zerlegt die a priori Verteilung in bedingte Verteilungen

$$p(\theta) = p(k, c, \mu, \sigma^2) = p(\mu|c, \sigma^2)p(\sigma^2)p(c|k)p(k) \quad (7)$$

Wir wählen:

$$p(k) = \frac{1}{K}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$p(c|k) = \frac{1}{\{\text{Area}(\tau)\}^k}, \quad c \in \tau^k \quad (9)$$

$$p(\sigma^{-2}) = \text{Gamma}(\sigma^{-2}|a, b), \quad \sigma^2 > 0 \quad (10)$$

Die a priori Verteilung:

Hierarchischer Bayes Schätzer: Zerlegt die a priori Verteilung in bedingte Verteilungen

$$p(\theta) = p(k, c, \mu, \sigma^2) = p(\mu|c, \sigma^2)p(\sigma^2)p(c|k)p(k) \quad (7)$$

Wir wählen:

$$p(k) = \frac{1}{K}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$p(c|k) = \frac{1}{\{\text{Area}(\tau)\}^k}, \quad c \in \tau^k \quad (9)$$

$$p(\sigma^{-2}) = \text{Gamma}(\sigma^{-2}|a, b), \quad \sigma^2 > 0 \quad (10)$$

$$p(\mu|c, \sigma^2) = \prod_{i=1}^k N(\mu_i|0, \sigma^2 v), \quad \mu \in \mathbb{R}^k \quad (11)$$

Die Likelihood-Funktion

Außerdem können wir $p(D|\theta)$ bestimmen:

- $\theta = (c, \mu, \sigma^2)$
- $y_i = \bar{y} + z(x_i) + \epsilon_i$ für $i = 1, \dots, n$
- $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$

Die Likelihood-Funktion

Außerdem können wir $p(D|\theta)$ bestimmen:

- $\theta = (c, \mu, \sigma^2)$
- $y_i = \bar{y} + z(x_i) + \epsilon_i$ für $i = 1, \dots, n$
- $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$

Damit gilt:

$$p(D|\theta) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} - \mu_{r(i)})^2 \right\} \quad (12)$$

$k = 1, \dots, K$, und $r(i)$ Index des i -ten Gebiets

Marginal Likelihood

Da es sich um konjugierte Prior handelt, können wir die Likelihood Funktion vereinfachen:

$$\begin{aligned}
 P(D|c) &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^k} p(D|\mu, \sigma^2, c) p(\mu|\sigma^2, c) p(\sigma^2) d\mu d\sigma^2 \\
 &= \frac{(2b)^a \Gamma(a^*)}{\pi^{n/2} \Gamma(a)} \frac{(2b^*)^{-a^*}}{\prod_{i=1}^k (n_i + 1)^{1/2}},
 \end{aligned}$$

für $k = 1, \dots, K$

$$a^* = a + n/2,$$

$$b^* = b + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \left\{ \sum_{j:r(j)=i} (y_j - \bar{y})^2 - \frac{vn_i^2}{1+vn_i} \bar{y}_i^2 \right\}$$

$$n_i = \sum_{j:r(j)=i} 1,$$

$$\bar{y}_i = n_i^{-1} \sum_{j:r(j)=i} (y_j - \bar{y})$$

Vorhersage der Schadenhöhen an vorgegebenen Positionen

Sei $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$

Da $y = \bar{y} + z(x) + \epsilon$

$$\Rightarrow p(y|x, c, \mu, \sigma^2, D) = N(y|\mu_x, \sigma^2) \quad (13)$$

Vorhersage der Schadenhöhen an vorgegebenen Positionen

Sei $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$

Da $y = \bar{y} + z(x) + \epsilon$

$$\Rightarrow p(y|x, c, \mu, \sigma^2, D) = N(y|\mu_x, \sigma^2) \quad (13)$$

Durch Integration nach μ, σ^2 erhalten wir:

$$p(y|x, c, D) = Student \left\{ \frac{n_x \bar{y}_x}{n_x + v^{-1}}, b^* \left(1 + \frac{1}{n_x + v^{-1}} \right), a^* \right\} \quad (14)$$

wobei n_x die Anzahl der Schäden y_i beschreibt, die im selben Gebiet wie x liegen

$$p(y|x, D) = \int p(y|x, c, D)p(c|D)dc \quad (15)$$

Wir wissen:

$$p(y|x, c, D) = Student \left\{ \frac{n_x \bar{y}_x}{n_x + v^{-1}}, b^* \left(1 + \frac{1}{n_x + v^{-1}} \right), a^* \right\} \quad (16)$$

$$p(y|x, D) = \int p(y|x, c, D)p(c|D)dc \quad (15)$$

Wir wissen:

$$p(y|x, c, D) = Student \left\{ \frac{n_x \bar{y}_x}{n_x + v^{-1}}, b^* \left(1 + \frac{1}{n_x + v^{-1}}\right), a^* \right\} \quad (16)$$

$$p(c|D) \propto p(D|c)p(c) \quad (17)$$

$$p(c) = \frac{1}{K} \frac{1}{\{Area(\tau)\}}, \quad c \in \bigcup_{k=1}^K \tau^k$$

$$p(D|c) = \frac{(2b)^a \Gamma(a^*)}{\pi^{n/2} \Gamma(a)} \frac{(2b^*)^{-a^*}}{\prod_1^k (n_i + 1)^{1/2}}$$

Problem

Das Integral ist nicht analytisch zu bestimmen.

Problem

Das Integral ist nicht analytisch zu bestimmen.

Idee

Erzeuge Zentren $c^{(1)}, \dots, c^{(J)}$ als Realisierungen von $p(c|D)$

Problem

Das Integral ist nicht analytisch zu bestimmen.

Idee

Erzeuge Zentren $c^{(1)}, \dots, c^{(J)}$ als Realisierungen von $p(c|D)$

$$\tilde{y}(x) = \bar{y} + \tilde{z}(x) \quad (18)$$

mit $\tilde{z}(x) = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \tilde{z}^{(j)}(x)$,

wobei $\tilde{z}^{(j)}(x) = E(y|x, c^{(j)}, D) = \frac{n_x \bar{y}_x}{n_x + \nu - 1}$

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus**
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus**
 - **Markov-Ketten**
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Wiederholung(1)

- Für den Algorithmus wird eine Markov-Kette benötigt
- Geben zunächst eine Wiederholung der wichtigsten Begriffe
- Der Übersicht halber betrachten wir nur den Fall eines endlichen Zustandsraumes $E = \{1, 2, \dots, l\}$

Wiederholung(2)

Definition: Markov-Kette

- Sei $X_0, X_1, \dots : \Omega \rightarrow E$ eine Folge von Zufallsvariablen über einunddemselben Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ mit Werten in $E = \{1, 2, \dots, l\}$
- X_i heißt (homogene) Markov-Kette mit Anfangsverteilung $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ und der Übergangsmatrix $P = (p_{ij})$, falls

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \alpha_{i_0} p_{i_0 i_1} \dots p_{i_{n-1} i_n} \quad (19)$$

für beliebige $n=0, 1, \dots$ und $i_0, i_1, \dots, i_n \in E$ gilt

Wiederholung(3)

- α_i = Wahrscheinlichkeit, dass sich das betrachtete System zur Zeit $n = 0$ im Zustand i befindet
- $\alpha_i \in [0,1], \sum_{i=1}^I \alpha_i = 1$
- $I \times I$ Matrix $P = (p_{ij})_{i,j=1,\dots,I}$ der Übergangswahrscheinlichkeiten mit

$$p_{ij} > 0, \quad \sum_{j=1}^I p_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (20)$$

Wiederholung(4)

Definition: Stationäre Verteilung

Eine Verteilung μ heißt stationär, wenn sie der Gleichung

$$\mu^T = \mu^T P, \quad \mu_i \geq 0, \quad \sum_i \mu_i = 1 \quad (21)$$

genügt

Wiederholung(5)

Bemerkung

- Definition gilt nur für endliche Zustandsräume
⇒ Nur bei Simulation auf einem Gitter gegeben
- Soll im Beobachtungsraum χ stetig simuliert werden ist eine Verallgemeinerung des Begriffs der Markov-Kette für überabzählbare Zustandsräume nötig
⇒ Markov-Prozesse

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus**
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler**
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Problemstellung:

$\tilde{z}(x)$ in einem Partition Model aus
den Daten zu berechnen

Vorgehensweise:

- Verwenden Metropolis-Hastings Algorithmus
- Erhalten eine Markov-Kette von Tesselationen des Beobachtungsraumes χ
- stationäre Verteilung dieser Markov-Kette ist a posteriori Verteilung $p(c|D)$
- Berechnung von $\tilde{z}(x)$ mit Hilfe von $p(c|D)$
- Es genügt die Lage der Zentren zu simulieren $\Rightarrow$ Tesselation eindeutig bestimmt
- Variable Anzahl von Zentren $\Rightarrow$ Reversible-Jump-Sampler

Bezeichnungen im Algorithmus:

- k : aktuelle Anzahl der Zentren
- K : maximale Anzahl der Zentren
- d_k : Wahrscheinlichkeit für Death-Step
- b_k : Wahrscheinlichkeit für Birth-Step
- $m_k = (1 - d_k - b_k)$: Wahrscheinlichkeit für Move-Step

Algorithmus(1)

```
Wähle Startwert  $c^{(0)}$ ; Setze  $t = 0$ ;  
REPEAT  
  Erzeuge  $u_1$  gemäß  $U(0,1)$  Verteilung;  
  IF  $u_1 \leq b_k$   
     $c' = \text{Birth-proposal}(c^{(t)})$ ;  
  ELSE IF  $b_k < u_1 \leq b_k + d_k$   
     $c' = \text{Death-proposal}(c^{(t)})$ ;  
  ELSE  
     $c' = \text{Move-proposal}(c^{(t)})$ ;  
  ENDIF;
```

Algorithmus(2)

Erzeuge u_2 gemäß $U(0,1)$ Verteilung;

IF $u_2 < \min\{1, BF(c', c^{(t)})\} = \min\{1, \frac{p(D|c')}{p(D|c^{(t)})}\}$

$c^{(t+1)} = c'$;

ELSE

$c^{(t+1)} = c^{(t)}$;

ENDIF;

$t = t+1$;

Nehme jeden m -ten Wert von $c^{(t)}$ nach burn-in;

END REPEAT;

Birth-Proposal($c^{(t)}$)

- Erzeuge z gemäß $U\{\tau \setminus c\}$ Verteilung
- Setze $c' = (c^{(t)}, z)$

Death-Proposal($c^{(t)}$)

- Erzeuge z gemäß $U\{1, \dots, k\}$ Verteilung
- Setze $c' = (c_{-z}^{(t)})$

Notation: $x_{-z} = (x_1, \dots, x_{z-1}, x_{z+1}, \dots, x_k)$

Move-Proposal($c^{(t)}$)

- $c^* = \text{Death-Proposal}(c^{(t)})$
- $c^{**} = \text{Birth-Proposal}(c^*)$
- Setze $c' = c^{**}$

Der Bayes-Faktor

$\frac{p(D|c')}{p(D|c^{(t)})}$ nur definiert, wenn $p(D|c^{(t)}) > 0$

$\Rightarrow$ wähle Startwert $c^{(0)}$ so, dass $p(D|c^{(0)}) > 0$

$\Rightarrow p(D|c^{(t)}) > 0 \forall t > 0$, da $p(D|c') = 0$ zur Ablehnung führt.

Der Bayes-Faktor: Berechnung

Für den Bayes-Faktor BF gilt:

$$\begin{aligned}
 \text{BF}(c', c^{(t)}) &= \frac{p(D|c')}{p(D|c^{(t)})} = \\
 &= \frac{(2b)^a \Gamma(a^*)}{\pi^{n/2} \Gamma(a)} \frac{(2(b')^*)^{-a^*}}{\prod_{i=1}^k (n'_i + 1)^{1/2}} \setminus \frac{(2b)^a \Gamma(a^*)}{\pi^{n/2} \Gamma(a)} \frac{(2(b^{(t)})^*)^{-a^*}}{\prod_{i=1}^k (n_i^{(t)} + 1)^{1/2}} = \\
 &= \frac{(2(b')^*)^{-a^*}}{\prod_{i=1}^k (n'_i + 1)^{1/2}} \frac{\prod_{i=1}^k (n_i^{(t)} + 1)^{1/2}}{(2(b^{(t)})^*)^{-a^*}} = \\
 &= \left(\frac{(b^{(t)})^*}{(b')^*} \right)^{a^*} * \frac{\prod_{i=1}^k (n_i^{(t)} + 1)^{1/2}}{\prod_{i=1}^k (n'_i + 1)^{1/2}}
 \end{aligned}$$

Anmerkung: Parameter a, b und $a^* = a + n/2$ hängen nicht von der Wahl der Zentren c ab!!!

Wahl der Parameter:

- $b_K = d_0 = m_0 = 0$
- $b_0 = 1$
- $d_K = m_K = \frac{1}{2}$
- $b_k = d_k = m_k = \frac{1}{3}$ für alle $k \neq 0, K$

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus**
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel**
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Definition Equivalent Kernel

Für ein x und eine Folge von Zentren $c^{(1)}, \dots, c^{(j)}$ ist der equivalent Kernel gegeben durch:

$$K(x, x') = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \frac{\mathbb{1}(r_{x'}^{(j)} = r_x^{(j)})}{Area^{(j)}(r_x^{(j)})}, \quad x' \in \mathcal{X}$$

wobei:

- $r_x^{(j)}$: Index der Region in welcher x bei Tesselation j liegt, analog für $r_{x'}^{(j)}$
- $Area^{(j)}(i)$: Flächeninhalt des i -ten Gebietes bei der j -ten Tesselation

→ Equivalent Kernel Kenngröße für die Korrelation der beiden Punkte x und x'

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus**
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel**
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Datensatz

- Lage und Höhe der jährlichen Sturmschäden in Österreich
- betrachtete Jahre: 1996 - 2006

Aufgabenstellung

- Modellierung der Schadenshöhe
- Untersuchung von Abhängigkeiten zwischen den Schadensfällen
- Verwenden Reversible-Jump-Sampler zur Simulation der a posteriori Verteilung $p(c|D)$
- Berechnen $\tilde{z}(x)$ als Schätzer für die Schadenshöhe am Punkt x
- Wähle χ als Rechteck, welches Österreich einschließt

Beispiel: eine vom Reversible-Jump-Sampler erzeugte Tesselation

Abbildung: logarithmische Durchschnitts-Schäden in den einzelnen Gebieten einer Tesselation im Jahr 1999

Beispiel: eine weitere vom Reversible-Jump-Sampler erzeugte Tessellation

Abbildung: logarithmische Durchschnitts-Schäden in den einzelnen Gebieten einer Tessellation im Jahr 2002

Bestimmung der Abhängigkeiten

- Equivalent Kernel $K(x,x')$ Kenngröße für die Abhängigkeit der Punkte x und x'
- Um die Abhängigkeit eines Punktes x von der Umgebung darzustellen legt man über χ ein Gitter von Punkten
- Berechnen $K(x,x')$ für alle x' aus dem Gitter
- Der Flächeninhalt einer Region wird mit der Summe der Gitterpunkte in dieser Region approximiert
- Interpretation von $K(x,x')$ als Pixelwert $\rightarrow$ farbliche Darstellung der Abhängigkeit
- Im Folgenden steht ein Pixel für ein Fläche von $500 * 500$ Metern

Kernel 1 bei im Jahr 1996

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

Zum Vergleich: Kernel 1 bei im Jahr 1999

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

Kernel 1 bei im Jahr 2002 - Achtung: Weniger Iterationen

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

Kernel 2 im Jahr 1996

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

Zum Vergleich: Kernel 2 im Jahr 1999

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

Kernel 2 im Jahr 2002 - Achtung weniger Iterationen

blau: hohe Abhängigkeit bis rot: niedrige Abhängigkeit
weiß: keine Abhängigkeit

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 **Literatur**
- 6 Anhang

Literatur

- David G.T. Dension, Andrew B. Lawson
Spatial Cluster Modelling, Chapter 7
Chapmann & Hall/CRC
- David G.T. Dension and Christopher C.Holmes
Bayesian Methods for Nonlinear Classification and Regression
John Wiley and sons, LTD
- Christian P. Robert
The Bayesian Choise A Decision-Thearetic Motivation
Springer Texts in Statistics, 1997
- Volker Schmidt
Vorlesungsskript Wahrscheinlichkeitstheorie
Ulm, im Juli 2006

- 1 Motivation
- 2 Das kollektive Modell
- 3 Partition Modelling
 - Problemstellung
 - Das Voronoi Mosaik
 - Partition Model
 - Bayes Schätzer
- 4 Simulationsalgorithmus
 - Markov-Ketten
 - Reversible-Jump-Sampler
 - Equivalent Kernel
 - Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

Die Dichte der multivariaten p -dimensionalen Student Verteilung mit Parametern Σ , μ , n :

$$\frac{\Gamma\left(\frac{n+p}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)n^{\frac{p}{2}}\pi^{\frac{p}{2}}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}\left(1 + \frac{1}{n}(x - \mu)^T \Sigma^{-1}(x - \mu)\right)^{\frac{n+p}{2}}} \quad (22)$$