Phase Transitions in Infinite Networks

Dominik Brugger, Frank Eisenbarth | 6. Mai 2008

Ziele des Vortrags

Ziele

- ▶ **Zufällige Netzwerke** einführen
- ▶ grundlegende **Modelle** beschreiben
- ▶ wichtige **Eigenschaften** erklären
- ▶ Phänomen der **Perkolation**
- ▶ elementare **Beweistechniken** anwenden

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolationsmodell
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolationsmodell
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Aktivkohlefilter

Funktionsweise

- ▶ Aktivkohlefilter bildet **Labyrinth**
- ▶ Aktivkohle absorbiert Schadstoffe
- ▶ Leistung hängt von der Verweildauer der Luft im Filter ab

Aktivkohlefilter

Interessante Beobachtungen

Ziele

- ▶ Möglichst hohe Dichte an Aktivkohle
- ▶ Durchlässigkeit (**Perkolation**)

Beobachtung

- ▶ Änderung der Dichte bewirkt Übergang zwischen zwei extremen Zuständen
- ▶ 1. Luft dringt nicht durch
- ▶ 2. Luft dringt durch (**Perkolation**)
- ▶ Dieser Übergang geschieht *abrupt*
- ▶ $\rightsquigarrow$ **Phasenübergang**

Weitere Anwendungen

Weitere Anwendungsgebiete

- ▶ Materialwissenschaften
- ▶ Kommunikationsnetzwerke
- ▶ Elektrotechnik

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolationsmodell
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell

Modell

- ▶ Punkte = $\mathbb{Z}^2$
- ▶ Bernoulli-Experiment $\rightsquigarrow$ Verbindung

Komponenten

Definition Komponente

- ▶ $C(x)$ = Menge von Punkten, die mit x verbunden sind

Perkolations-Wahrscheinlichkeit

Definition

$$\begin{aligned}\theta(p) &= \mathbb{P}_p(|C(0)| = \infty) \\ &= 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_p(|C(0)| = n)\end{aligned}$$

für $p \in [0, 1]$

Perkolations-Wahrscheinlichkeit - Grundlegende Eigenschaften

Trivial

$$\theta(0) = \mathbb{P}_0 (|C(0)| = \infty) = 0$$

und

$$\theta(1) = \mathbb{P}_1 (|C(0)| = \infty) = 1$$

Perkolations-Wahrscheinlichkeit - Monotonie

Theorem 1 (*Monotonie*)

$$\theta(p_1) \leq \theta(p_2) \quad \forall p_1 < p_2$$

Beweistechnik: Coupling

Coupling Technik

- ▶ Start: Realisierung des Gitter-Modells mit Parameter p_2
- ▶ Thinning: streiche Kante mit Wahrscheinlichkeit $1 - \frac{p_1}{p_2}$
- ▶ $\rightsquigarrow$ Realisierung des Gitter-Modells mit Parameter p_1

Phasenübergang - Kritischer Wert für p

Theorem 2

$$\exists p_c \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$$

$$\theta(p) = 0, \quad p < p_c$$

$$\theta(p) > 0, \quad p > p_c$$

Korollar

$\theta(p) > 0 \Leftrightarrow$ unbeschränkte Komponente existiert *fast sicher*

Beweis Teil I

Ziel

Zeige:

$$\theta(p) = 0 \quad \text{für } p < 1/3$$

Counting-Argument

- ▶ betrachte *vollständig verbundenes* Gitter
- ▶ betrachte *alle* Pfade vom Ursprung der Länge n
- ▶ gib jedem eine Nummer

Definition

$$\sigma(n) = \text{Anzahl solcher Pfade}$$

Beweis Teil I

Obere Schranke

$$\sigma(n) \leq 4 \cdot 3^{n-1}$$

Beweis Teil I

Definition

- ▶ $N(n)$ = Anzahl Pfade der Länge n vom Ursprung im betrachteten **zufälligen Gitter**
- ▶ ZV $\mathbb{I}_j = \begin{cases} 1 & \text{Pfad } j \text{ existiert} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Ungleichungskette

$$\begin{aligned} \theta(p) &\leq \mathbb{P}_p(N(n) \geq 1) \\ &= \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{j=1}^{\sigma(n)} \{\mathbb{I}_j = 1\}\right) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\sigma(n)} \mathbb{P}_p(\mathbb{I}_j = 1) = \sigma(n) \cdot p^n \end{aligned}$$

Beweis Teil I

Erinnerung

$$\sigma(n) \leq 4 \cdot 3^{n-1}$$

Grenzwertbetrachtung

$$\theta(p) \leq 4 \cdot 3^{n-1} \cdot p^n = 4p \cdot (3p)^{n-1} \xrightarrow{!} 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

gilt für $p < 1/3$

Beweis Teil II

Ziel

$$\theta(p) > 0 \quad \text{für } p > 2/3$$

Beweis Teil II - Duales Gitter

Punkte im dualen Gitter

$$\left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2}\right) \times \left(\mathbb{Z} + \frac{1}{2}\right)$$

Beweis Teil II - Zufälliges duales Gitter G^d

- ▶ G zufälliges Gitter
- ▶ G^d dazu *duales zufälliges Gitter*
- ▶ betrachte je zwei Punkte aus G^d
- ▶ diese sind verbunden, falls sie keine Kante in G kreuzen

Beweis Teil II - Umgebende Zyklen

Dualität

Jede **beschränkte** Komponente wird von einem Zyklus im dualen Gitter umgeben

Beweis Teil II - Umgebende Zyklen

Dualität

$|C(0)| < \infty \Leftrightarrow$ Ursprung ist von dualem Zyklus umgeben

$|C(0)| = \infty \Leftrightarrow \nexists$ dualer Zyklus, der den Ursprung umgibt

Beweis Teil II

Skizze

$$\mathbb{P}_p \left(\bigcup_{x \in \delta B_k} \{ |C(x)| = \infty \} \right) = \mathbb{P}_p \left(\bigcap_{\gamma \in C_k} \gamma \notin G^d \right) > 0$$

für $p > 2/3$ und k groß genug

Beweis Teil II

Resultate

- ▶ Teil I: $p < 1/3 : \theta(p) = 0$
- ▶ Teil II: $p > 2/3 : \theta(p) > 0$

Fazit

Aufgrund der Monotonie von θ in p gilt

$$\exists p_c \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right]$$

$$\theta(p) = 0, \quad p < p_c$$

$$\theta(p) > 0, \quad p > p_c$$

q.e.d.

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolaton
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Punktprozess

Definition

- ▶ X = zufällige Punktmenge auf $\mathbb{R}^2$

Wünschenswerte Eigenschaften

- ▶ *Stationarität*
- ▶ *Unabhängigkeit*
- ▶ *keine Häufungspunkte*

Punktprozess - Stationarität

Definition Stationarität

Die Verteilung der Punkte ist translationsinvariant

Punktprozess - Unabhängigkeit

Definition Unabhängigkeit

Die Anzahl der Punkte in disjunkten Gebieten ist unabhängig

Homogener Poisson Prozess

Notation

$D \in \mathcal{B}_0(\mathbb{R}^2)$ beschränktes Gebiet

- ▶ $|D|$ = Lebesgue-Maß
- ▶ $N : \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{N}_0$
- ▶ N_D = Anzahl der Punkte von X in D

Definition: Homogener Poisson Prozess

$N_{D_1}, N_{D_2}, \dots$ unabhängig $\forall D_i \in \mathcal{B}_0(\mathbb{R}^2), D_j \cap D_k = \emptyset, j \neq k$

$$\mathbb{P}(N_D = k) = e^{-\lambda \cdot |D|} \frac{(\lambda \cdot |D|)^k}{k!} \quad \forall D \in \mathcal{B}_0(\mathbb{R}^2)$$

Homogener Poisson Prozess

Konstruktion im Einheitsquadrat

- ▶ n Anzahl der Punkte Poisson-verteilt mit Parameter λ
- ▶ Generiere n Punkte gleichverteilt, d.h. $x_i, y_i \sim U[0, 1]$

Poisson-Prozess mit Intensität $\lambda = 100$

Punkte - und nun?

Frage

Wie sind diese zu verbinden?

k -Nächste-Nachbar-Modell

Modell

- ▶ Poisson Punkt Prozess X mit Intensität $\lambda > 0$
- ▶ verbinde jeden Punkt mit seinen k nächsten Nachbarn

1-Nächste-Nachbar-Modell

Phasenübergang - Kritischer Wert für k

Definition

- Ereignis U_0 = unbeschränkte Komponente existiert in 0

Theorem 3

$\exists k_c \geq 2$

$$\mathbb{P}_k(U_0) = 0, \quad k < k_c$$

$$\mathbb{P}_k(U_0) > 0, \quad k \geq k_c$$

Beweis - Einführung Knotenperkolation

Modell

- ▶ Teile Ebene in Quadrate auf
- ▶ Quadrate werden mit Wahrscheinlichkeit p besetzt
- ▶ benachbarte Quadrate die eine Seite teilen sind verbunden

Beweis - Einführung Knotenperkolation

Phasenübergang - Kritischer Wert für p

$$\exists p_c \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$$

$$\theta(p) = 0, \quad p < p_c$$

$$\theta(p) > 0, \quad p > p_c$$

Näherungswert für p_c

$$p_c \approx 0.59$$

Beweis - Renormalisierung

Renormalisierung

Idee: Knotenperkolation $\Rightarrow$ Perkolation im Nächste-Nachbar-Modell

Beweis - Aufteilung der Ebene

Vorgehensweise

- ▶ teile Ebene in Einheitsquadrate auf
- ▶ unterteile Einheitsquadrate
- ▶ $\rightsquigarrow 7^2$ Unterquadrate

Beweis - *Gute Einheitsquadrate*

Definition Ereignisse

- ▶ Ereignis A = jedes Unterquadrat enthält mindestens einen Punkt
- ▶ Ereignis B = jedes Unterquadrat enthält maximal $\frac{m}{7^2}$ Punkte

Definition Gutes Einheitsquadrat

Einheitsquadrat in dem A und B auftreten heißt *gut*

Perkolation

Wenn

$$P(\text{gut}) = P(A \cap B) > p_c$$

perkolieren die guten Quadrate im Gitter

Beweis - Wahl der Parameter für Wahrscheinlichkeit *guter* Einheitsquadrate

Parameter

- ▶ Wähle Intensität λ so hoch, dass

$$P(A) > \frac{1 + p_c}{2}$$

- ▶ Wähle m so, dass

$$P(B) > \frac{1 + p_c}{2}$$

Abschätzung

$$\Rightarrow P(A \cap B) > p_c$$

Beweis - *Gute Einheitsquadrate*

- ▶ Stand: gute Quadrate perkolieren im Gitter
- ▶ Zu zeigen: Punkte perkolieren im Nächste-Nachbar-Modell
- ▶ Idee: Zentren angrenzender guter Quadrate sind verbunden

Beweis - Punkte angrenzender Unterquadrate in guten Einheitsquadraten sind verbunden

- ▶ max m Punkte im Kreis $\subset$ Einheitsquadrat
- ▶ x ist im m -Nächste-Nachbar-Modell mit allen Punkten im Kreis verbunden
- ▶ insbesondere mit denen der angrenzenden Unterquadrate

Zufälliges Verbindungs-Modell

Modell

- ▶ Poisson Punkt Prozess X mit Intensität $\lambda > 0$
- ▶ verbinde x und y mit Wahrscheinlichkeit $g(x - y)$

Zufälliges Verbindungs-Modell

Zufällige Verbindungs-Funktion

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$$

- ▶ hängt nur von $|\cdot|$ ab,
- ▶ nicht aber von der geometrischen Lage
- ▶ nicht-wachsend in $|\cdot|$
- ▶ verbinde x und y mit Wahrscheinlichkeit $g(x - y) = \tilde{g}(|x - y|)$

Beispiel: Boolesches Modell

Verbindungsfunktion

$$g(x - y) = \begin{cases} 1, & |x - y| \leq r \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Phasenübergang - Kritischer Wert für λ

Definition (*Perkolations-Wahrscheinlichkeit*)

$$\theta(\lambda) = \mathbb{P}_\lambda(|\mathbf{C}(0)| = \infty)$$

Theorem 4

$\exists 0 < \lambda_c < \infty$

$$\theta(\lambda) = 0, \quad \lambda < \lambda_c$$

$$\theta(\lambda) > 0, \quad \lambda > \lambda_c$$

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolaton
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Zusammenfassung

Fazit

- ▶ Perkolations zentrale Eigenschaft von zufälligen Netzwerken
- ▶ Phasenübergang geschieht abrupt
- ▶ Es gibt kritische Werte für Modellparameter
- ▶ Analogie in allen betrachteten Modellen
- ▶ Zusammenhang diskreter und stetiger Modelle

Ausblick

Ausblick

- ▶ Anwendung für *endliche* zufällige Netzwerke
- ▶ Resultate sind Indikatoren für das Verhalten von endlichen zufälligen Netzwerken

Überblick

Einführung

- Anwendungsbeispiel
- Motivation

Diskretes Modell - Zufälliges Gitter

- Zufälliges Gitter - Kantenperkolationsmodell
- Perkolationsmodell
- Perkolations-Wahrscheinlichkeit
 - Eigenschaften
 - Phasenübergang

Stetige Modelle

- Poisson Prozess
- Nächste-Nachbar-Modell
- Zufälliges Verbindungs-Modell

Zusammenfassung und Ausblick

Quellenangaben

Verwendete Quellen

Literatur

- ▶ M. Franceschetti, R. Meester: *Random Networks for Communication*. Cambridge University Press, 2007

Bildnachweis

- ▶ Aktivkohlefilter, *Wikipedia*
<http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aktivkohlerp.jpg>, abgerufen am 26.4.2008