Zufallsfelder

Eugen Fot

15.07.2010

Inhaltsverzeichnis

Einführung und Definitionen

Zufallsfelder

Stationäre Zufallsfelder

Isotrope Zufallsfelder

Kovarianzfunktionen

Positiv definite Funktionen

Hinreichende Kriterien für positiv definite Funktionen

Gebräuchliche Modelle und Simulationen

Einführung und Definition

- ▶ *Def:* Sei $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(S, \mathcal{B})$ ein meßbarer Raum. Ein **Zufallselement** $X : \Omega \rightarrow S$ ist eine $\mathcal{F}|\mathcal{B}$ meßbare Abbildung von $(\Omega, \mathcal{F})$ nach $(S, \mathcal{B})$:
$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{B}$$
- ▶ Eine Familie von zufälligen Elementen $X = \{X(t), t \in T\}$, welche auf $(\Omega, \mathcal{F})$ gegeben sind , nennt man **zufällige Funktionen**

Einführung und Definition

- ▶ alle zufälligen Elemente $X(t), t \in T$, sind auf dem gleichen Meßraum $(\Omega, \mathcal{F})$ definiert, unterscheiden sich aber in ihren Werten
- ▶ man betrachtet dann die meßbaren Räume $(S_t, \mathcal{B}_t)_{t \in T}$
- ▶ $X = X(t, \omega)$ ist definiert auf $T \times \Omega$
- ▶ Falls ω fix ist, dann nennt man $X(\cdot, \omega)$ eine **Trajektorie**

Einführung und Defintion

- ▶ $T \subset \mathbb{R}$: $t \hat{=}$ Zeitparameter
 $X \hat{=}$ Stochastischer Prozess
- ▶ $T \subset \mathbb{R}^d, d > 1$, $X \hat{=}$ Zufallsfeld

Zufallsfelder

- ▶ Zufallsfeld $X = \{X(t, \omega) : t \subset \mathbb{R}^d, \omega \in \Omega\}$
- ▶ $X(t, \cdot)$ **Zufallsvariable**
- ▶ $X(\cdot, \omega)$ **Realisierung** des Zufallsfeldes

Gauß'sches Zufallsfeld

- ▶ falls $(X(t_1), \dots, X(t_n))^T \sim \mathcal{N}(a, \Sigma) \implies$ Gauß'sches Zufallsfeld

Zufallsfelder

- ▶ *Def:* Ein Zufallsfeld $X(t, \omega)$, $t \in \mathbb{R}^d$, ist von **zweiter Ordnung**, falls $\text{Var } X(t) < \infty \forall t \in \mathbb{R}^d$
- ▶ *Def:* Sei $X(t)$ ein Zufallsfeld zweiter Ordnung. Dann ist die **Kovarianzfunktion** definiert als
$$C(s, t) = \mathbb{E} \{ [X(s) - \mathbb{E}X(s)] [X(t) - \mathbb{E}X(t)] \}$$

Stationarität

- ▶ **Def:** Eine Funktion $f: \mathbb{R}^{nd} \rightarrow \mathbb{C}$ ist **translationsinvariant**, falls $f(x_1 + x, \dots, x_n + x) = f(x_1, \dots, x_n) \forall n \in \mathbb{N} \forall x, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$
- ▶ **Def:** $\forall n \in \mathbb{N} \forall t_1, \dots, t_n \in T$ nennt man $P_{t_1, \dots, t_n}(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) = P(X(t_1) \in B_{t_1}, \dots, X(t_n) \in B_{t_n})$ von $(X(t_1), \dots, X(t_n))^T$ eine endlich-dimensionale Verteilung von $X = \{X(t), t \in T\}$

Stationarität

- ▶ Falls $P(X(t_1 + \tau) \in B_1, \dots, X(t_n + \tau) \in B_n) = P(X(t_1) \in B_1, \dots, X(t_n) \in B_n) \forall \tau, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}^d \forall B_i \in \mathcal{B}_{t_i} \forall n \in \mathbb{N}$, gilt, dann heißt das Zufallsfeld **stationär (im strengen Sinne)**

Stationarität

- ▶ Ein Zufallsfeld X zweiter Ordnung heißt **stationär (im weiten Sinne)**, falls
 - (i) $\mathbb{E}X(t) = c \quad \forall t \in \mathbb{R}^d$
 - (ii) $C(s, t) = C(s + \tau, t + \tau) \quad \forall s, t, \tau \in \mathbb{R}^d$

Stationarität

- ▶ *Bemerkung*: In diesem Fall reduziert sich die Kovarianzfunktion auf ein Argument:
$$C(s, t) = C(s - t, 0) = \mathbb{E} [X(s - t)X(0)] - c^2 = C(h) \text{ mit } h:=s-t$$
- ▶ stationär im weiten Sinne $\not\iff$ stationär im strengen Sinne

Stationarität

- ▶ $X(t)$ Gauß'sches Zufallsfeld:
 X stationär im strengen Sinne $\iff X$ stationär im weiten Sinne

Isotropie

- ▶ Eine Funktion $f: \mathbb{R}^{nd} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **rotationsinvariant**, falls
$$f(Ax_1, \dots, Ax_n) = f(x_1, \dots, x_n) \quad \forall x_i \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, n \quad \forall A \in SO(d)$$

Isotropie

- ▶ Ein Zufallsfeld heißt **isotrop** im strengen Sinne, falls
$$P(X(At_1) \in B_1, \dots, X(At_n) \in B_n) = P(X(t_1) \in B_1, \dots, X(t_n) \in B_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall B_i \in \mathcal{B}_{t_i} \quad \forall A \in SO(d)$$
- ▶ Ein Zufallsfeld X heißt **isotrop** im weiten Sinne, falls der Erwartungswert und die Kovarianzfunktion rotationsinvariant sind: $\mathbb{E}X(At) = \mathbb{E}X(t)$ und $C(As, At) = C(s, t)$

Positiv definite Funktionen

- ▶ Eine Funktion $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **positiv semidefinit**, falls
$$0 \leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_k f(t_k - t_j) \bar{a}_j \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t_k \in \mathbb{R}^d, \quad \forall a_k \in \mathbb{C}$$
- ▶ Sei X ein Zufallsfeld zweiter Ordnung. Dann hat die Kovarianzfunktion folgende Eigenschaft:
$$0 \leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_k C(t_k, t_j) \bar{a}_j \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall a_k \in \mathbb{C} \quad \forall t_k \in \mathbb{R}^d$$
- ▶ $\implies$ Die Kovarianzfunktion eines stationären Zufallsfeldes im weiten Sinne ist eine positiv semidefinite Funktion

Positiv definite Funktionen

- ▶ **Theorem:** Gegeben sei eine Funktion $a = a(t)$ und eine symmetrische, positiv semidefinite Funktion $r = r(s - t)$ $s, t \in T$. Dann existiert ein $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ und eine Gauß'sche Zufallsfunktion $X = X(t)$, $t \in T$, sodass $\mathbb{E}X(t) = a(t)$ und $C(s, t) = r(s - t) \forall s, t \in T$
 $\implies$ Die Klasse der positiv semidefiniten Funktionen auf $\mathbb{R}^d$ und die Klasse der Kovarianzfunktionen der stationären (im weitem Sinne) komplexwertigen Zufallsfelder auf $\mathbb{R}^d$ sind identisch

Charakteristische Funktion

- ▶ Eine charakteristische Funktion φ mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf $\mathbb{R}^d$ ist wie folgt definiert:
$$\varphi(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t, \lambda \rangle} dP(t)$$
- ▶ **Bemerkung:** Eine charakteristische Funktion ist positiv semidefinit.

Positiv definite Funktionen

- ▶ *Theorem (Bochner-Khinchin)*: Eine in $0 \in \mathbb{R}^d$ stetige Funktion $C : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ ist eine positiv semidefinite Funktion genau dann, wenn sie die **Fourier-Stieltjes-Transformierte** mit einem endlichem Maß μ_c auf $\mathbb{R}^d$ ist: $C(\lambda) = \int e^{i\langle \lambda, t \rangle} \mu_c(dt) \forall \lambda \in \mathbb{R}^d$

Positiv definite Funktionen

- ▶ *Korollar:* Eine in $0 \in \mathbb{R}^d$ stetige Funktion $C : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ist positiv semidefinit genau dann, wenn sie die **Kosinustransformierte** mit einem endlichem Maß μ_c auf $[0, \infty)$ ist: $C(\lambda) = \int_0^\infty \cos(\langle \lambda, t \rangle) \mu_c(dt) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}^d$

Positiv definite Funktionen

- ▶ *Theorem (Riesz)*: Falls C eine positiv semidefinite und meßbare Funktion ist, dann gilt: $C = C_c + C_0$, wobei C_c eine positiv semidefinite, stetige Funktion ist. Die Funktion C_0 ist positiv semidefinit und gleich 0 bzgl. dem Lebesguemaß auf $\mathbb{R}^d$.
- ▶ $\implies$ eine meßbare Funktion, welche nicht in eine stetige Funktion durch Änderung der Werte auf einer Nullmenge umgewandelt werden kann, ist keine positiv semidefinite Funktion.

- ▶ Bsp. für C_0 (nugget effect):
- ▶ $C_0(t) = \alpha \mathbf{1}_0(t) = \begin{cases} \alpha, & t = 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

Positiv definite Funktionen

- ▶ **Theorem (Schoenberg)**: Eine stetige und rotationsinvariante Funktion $C : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ist positiv semidefinit genau dann, wenn $C(x) = \varphi(\|x\|)$ wobei φ die Hankel-Transformation ist und μ ein endliches Maß auf $[0, \infty)$: $\varphi(h) = \int_0^\infty \Gamma\left(\frac{d}{2}\right) \left(\frac{2}{rh}\right)^{\frac{(d-2)}{2}} J_{\frac{(d-2)}{2}}(rh) \mu(dr)$, $h \geq 0$ wobei J die Besselfunktion erster Ordnung vom Grad $\frac{d-2}{2} \geq -\frac{1}{2}$ ist

Positiv definite Funktionen

- ▶ Für die Dimensionen $d = 1, 2, 3$ gilt:

$$J_{-\frac{1}{2}} = \cos(h) \sqrt{2} / \sqrt{\pi h}$$

$$J_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin(h \cosh t) dt$$

$$J_{\frac{1}{2}} = \sin(h) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi h}}$$

Positiv definite Funktionen

- ▶ *Theorem (Gneiting und Sasvari)*: Falls C eine positiv semidefinite, rotationsinvariante, meßbare Funktion auf $\mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, dann gilt $C = C_c + \alpha \mathbf{1}_0$, wobei C_c eine positiv semidefinite und stetige Funktion ist und $\alpha \geq 0$

Hinreichende Kriterien für Positiv definite Funktionen

- ▶ *Pólya's Kriterium für $\mathbb{R}^1$* : Falls $\varphi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $\varphi(0) = 1$, $\varphi(t)$ konvex und $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = 0$, dann ist $\varphi(\|\cdot\|)$ eine positiv semidefinite Funktion
- ▶ Pólya's Kriterium gibt eine bequeme Methode zur Konstruktion von positiv semidefiniten Funktionen. So ist z.B. $\varphi(t) = \exp^{-|t|}$ eine gültige positiv semidefinite Funktion

Hinreichende Kriterien für Positiv definite Funktionen

- ▶ *Askey's Kriterium:* Falls $\varphi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $\varphi(0) = 1$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = 0$ und $(-1)^k \varphi^{(k)}(t)$ konvex für $k = \left\lceil \frac{d}{2} \right\rceil$, dann ist $\varphi(\|\cdot\|)$ eine positiv semidefinite Funktion auf $\mathbb{R}^d$

- ▶ **Bessel-Familie** (gültig für $\mathbb{R}^d$):

$$\varphi_\nu(\|t\|) = 2^\nu \Gamma(\nu + 1) \|t\|^{-\nu} J_\nu(\|t\|) \quad \nu \geq \frac{(d-2)}{2}$$

Abbildung: Bessel, $\nu = 0.5$

Abbildung: Bessel, $\nu = 1$

Abbildung: Bessel, $\nu = 2$

Abbildung: Bessel, $\nu = 3$

- ▶ **Sphärisch** (gültig für $\mathbb{R}^3$):

$$C(t) = \left(1 - \frac{3}{2}\|t\| + \frac{1}{2}\|t\|^3\right) \mathbf{1}_{[0,1]}(\|t\|)$$

Abbildung: Sphärisch

- ▶ Weißes Rauschen:

$$C(x) = \mathbf{1}_0(h) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Abbildung: Weißes Rauschen

► stabil:

$$C(t) = \exp(-\|t\|^\kappa), \quad \kappa \in (0, 2]$$

Abbildung: stabil, $\kappa = 0.5$

Abbildung: stabil, $\kappa = 1$

Abbildung: stabil, $\kappa = 1.5$

Abbildung: stabil, $\kappa = 2$

Literaturverzeichnis

A.V.BULINSKI, A.N.SHIRYAEV: *Theorie stochastischer Prozesse (in russ. Sprache)* , Fizmalit, 2004.

SCHLATHER, MARTIN: *Introduction to Positive Definite Functions and Unconditional Simulation of Random Fields* , Technical Report ST-99-10, 1999.

SPODAREV, EVGENY: *Random Fields* , Lecture Notes, Ulm 2009.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit