Gaußsche Felder und Simulation

Inhalt

Einleitung

Zufallsfeld

Gauß-Prozess

Stetigkeit, Beschränktheit und Differenzierbarkeit

Ziel

Vorbereitung

Hauptaussagen

Simulation

Wiederholung

Unbedingte Simulation

Bedingte Simulation

Wahl von n

Zusammenfassung

Zufallsfeld

Motivation - Beispiel:

- ▶ Modellierung von Messwerten in Abhängigkeit vom Ort, z. B. Nitratkonzentration im Grundwasser in Baden-Württemberg:

- ▶ Ziel: Extrapolation auf Orte ohne vorhandene Messung.

Zufallsfeld

Definition

Ein stochastischer Prozess

$$\{Z(t, \omega) : t \in \mathbb{R}^d, \omega \in \Omega\}$$

heißt **Zufallsfeld**, speziell für $d \geq 2$.

Dabei ist

- ▶ $Z(t) := Z(t, \cdot)$ eine Zufallsvariable und
- ▶ $z(\cdot) := Z(\cdot, \omega)$ eine Realisierung des Zufallsfeldes.

Zufallsfeld: Erwartungswert- und Kovarianzfunktion

Definition

Für ein Zufallsfeld Z heißt

$$m : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto E(Z(t))$$

die **Erwartungswertfunktion** und

$$C : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, (s, t) \mapsto \text{Cov}(Z(s), Z(t))$$

die **Kovarianzfunktion**.

Falls $m(t) \equiv 0$, dann heißt Z **zentriert**.

Zufallsfeld: Stationarität

Definition

- ▶ Ein Zufallsfeld Z heißt **stationär** (im engeren Sinne), falls für alle $n \in \mathbb{N}$, $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}^d$, $h \in \mathbb{R}^d$ gilt:

$$(Z(t_1 + h), \dots, Z(t_n + h)) \stackrel{d}{=} (Z(t_1), \dots, Z(t_n))$$

- ▶ Ein Zufallsfeld heißt **stationär 2. Ordnung**, falls die Erwartungswertfunktion $m(t)$ konstant (und endlich) ist und die Kovarianzfunktion $C(s, t)$ nur von $s - t$ abhängt.
- ▶ Ein stationäres Zufallsfeld 2. Ordnung heißt **isotrop**, falls $C(h) = C(|h|)$.

Einleitung

Gauß-Prozess

- ▶ Stochastischer Prozess
- ▶ „Erweiterung“ der multivariaten Normalverteilung auf eine unendliche Indexmenge

- ▶ Beispiele:
Brownsche Bewegung, Gaußsches weißes Rauschen

Einleitung

Fragestellungen:

- ▶ Stetigkeit und Beschränktheit?
- ▶ Differenzierbarkeit?
- ▶ Simulationsverfahren

Gauß-Prozess

Definition

Ein stochastischer Prozess

$$\{Z(t, \omega) : t \in T, \omega \in \Omega\}$$

mit der Indexmenge $T \subset \mathbb{R}^d$ heißt **Gauß-Prozess** oder **Gaußsches Feld**, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$, $t_1, \dots, t_n \in T$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\alpha_1 Z(t_1) + \dots + \alpha_n Z(t_n) \sim N(\cdot, \cdot)$$

Wir nehmen an, dass Z nach $\mathbb{R}$ abbildet.

Bemerkung

Mit dem Existenzsatz von Kolmogorow kann man zeigen, dass ein solcher Gauß-Prozess existiert.

Inhalt

Einleitung

Zufallsfeld

Gauß-Prozess

Stetigkeit, Beschränktheit und Differenzierbarkeit

Ziel

Vorbereitung

Hauptaussagen

Simulation

Wiederholung

Unbedingte Simulation

Bedingte Simulation

Wahl von n

Zusammenfassung

Ziel

Fast sicher beschränkt:

$$P \left(\sup_{t \in T} |Z(t)| < \infty \right) = 1$$

Fast sicher stetig:

$$P \left(\lim_{s \rightarrow t} |Z(t) - Z(s)| = 0, \forall t \in T \right) = 1$$

(erfordert Metrik)

Wahl der Metrik

Definition

Die Pseudometrik

$$d(s, t) := \sqrt{E((Z(s) - Z(t))^2)}$$

nennen wir **kanonische Metrik** für T bzw. Z .

Bemerkung

T kompakt $\Rightarrow$ Wahl der Metrik irrelevant für Stetigkeit von Z .

Vorgehen

Später, für T kompakt:

- ▶ Unter der ein- und derselben Voraussetzung werden wir Beschränktheit und Stetigkeit erhalten.
- ▶ Diese hängt anschaulich von der „Größe“ von T ab.

⇒ Definiere ein Maß für die „Größe“ von T .

Entropie und Log-Entropie

Definition

Sei $B_d(t, \varepsilon)$ die Kugel um den Punkt t mit Radius ε unter der Metrik d , d. h.

$$B_d(t, \varepsilon) := \{s \in T : d(s, t) \leq \varepsilon\}$$

Sei $N(T, d, \varepsilon) \equiv N(\varepsilon)$ die Mindestanzahl benötigter Kugeln mit Radius ε , um T zu überdecken. $N(\varepsilon)$ heißt **(metrische) Entropie** und

$$H(T, d, \varepsilon) \equiv H(\varepsilon) := \log(N(\varepsilon))$$

entsprechend **Log-Entropie** für T (oder Z).

Stetigkeitsmodulus

Definition

Für eine Funktion $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir

$$\omega_{f,\tau}(\delta) := \sup_{s,t \in T: \tau(s,t) \leq \delta} |f(t) - f(s)|, \quad \delta > 0$$

den **Stetigkeitsmodulus** für f unter der Metrik τ .

Bemerkung

- ▶ Je kleiner der Stetigkeitsmodulus, desto „näher“ ist die Funktion an der Stetigkeit.
- ▶ Falls $\omega_{f,\tau}(\delta) \rightarrow 0$ für $\delta \rightarrow 0$, dann ist f stetig.

Hauptaussage

Theorem

Sei Z ein zentrierter Gauß-Prozess und T kompakt bzgl. der kanonischen Metrik.

Dann existiert ein zufälliges $\eta \in (0, \infty)$ und eine Konstante K , sodass

$$\omega_{Z,d}(\delta) \leq K \int_0^\delta \sqrt{H(\varepsilon)} d\varepsilon, \quad \forall 0 < \delta < \eta$$

Korollar

Wenn das obige Integral für ein δ endlich ist, dann ist Z f. s. stetig und beschränkt.

Hauptaussage

Beweisskizze:

- ▶ Konstruiere eine Teleskopsumme:

$$Z(t) - Z(t_0) = \sum_{j>i} (Z(\pi_j(t)) - Z(\pi_{j-1}(t))) , \forall t \in T$$

(spezielle Wahl von i und der Fkt. π_j erfordert T kompakt)

- ▶ Schätze damit für $0 < \delta < \eta$ ab:

$$|Z(t) - Z(s)| \leq K \int_0^\delta \sqrt{H(\varepsilon)} d\varepsilon , \forall s, t \in T : d(s, t) \leq \delta$$

(erfordert $Z(t) \sim N(0, \cdot)$, $\forall t \in T$)

Beispiel: Brownsche Bewegung

Sei W der Standard-Wiener-Prozess auf $T = [0, 1]$, also

- ▶ $W(0) = 0$
- ▶ $\{W(t), t \in T\}$ hat unabhängige Zuwächse
- ▶ $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s), \forall 0 \leq s < t$

Frage:

Wie sieht das Integral aus dem Theorem für diesen Prozess W aus?

Beispiel: Brownsche Bewegung

- ▶ Da $W(s) - W(t) \sim N(0, |s - t|)$:

$$d(s, t) \stackrel{\text{Def.}}{=} \sqrt{\mathbb{E}((W(s) - W(t))^2)} = \sqrt{|s - t|}$$

- ▶ $B_d(t, \varepsilon) = \{s \in T : d(s, t) \leq \varepsilon\} = \{s \in T : |s - t| \leq \varepsilon^2\}$
- ▶ $H(\varepsilon) = \log N(\varepsilon) = \log \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon^2} \right\rceil$:
 $N(\varepsilon)$ ist die Mindestanzahl der benötigten Kugeln mit Radius ε bzgl. $d(\cdot, \cdot)$, um $T = [0, 1]$ zu überdecken.

Also:

$$\int_0^\delta \sqrt{H(\varepsilon)} d\varepsilon = \int_0^\delta \sqrt{\log \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon^2} \right\rceil} d\varepsilon$$

Beispiel: Brownsche Bewegung

$$\int_0^\delta \sqrt{\log \left[\frac{1}{2\varepsilon^2} \right]} d\varepsilon$$

$$\begin{aligned} &\text{Wähle } \delta < 1 \\ &\leq \end{aligned}$$

$$\int_0^\delta \sqrt{\log \frac{1}{\varepsilon^2}} d\varepsilon$$

$$\begin{aligned} &\text{Subst.: } y = \frac{1}{\varepsilon^2} \\ &= \end{aligned}$$

$$\int_{\frac{1}{\delta^2}}^\infty \frac{\sqrt{\log y}}{2y^{\frac{3}{2}}} dy$$

$$\begin{aligned} &\text{Wähle } \delta \leq \frac{1}{2} \\ &\leq \\ &\text{dann: } \log y \leq \sqrt{y} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \int_{\frac{1}{\delta^2}}^\infty y^{-\frac{5}{4}} dy$$

$$= \frac{1}{2} \left[-4 \cdot \frac{1}{y^{\frac{1}{4}}} \right]_{\frac{1}{\delta^2}}^\infty$$

$$= 2 \cdot \sqrt{\delta}$$

Anwendung: Hinreichende Bedingung

Theorem

Sei Z ein zentrierter Gauß-Prozess, T kompakt und $|\cdot|$ die euklidische Metrik. Wenn für ein $0 < C < \infty$ und $\alpha, \eta > 0$

$$E(|Z(s) - Z(t)|) \leq \frac{C}{|\log |s - t||^{1+\alpha}}, \quad \forall s, t \in T : |s - t| < \eta$$

gilt, dann ist Z f. s. stetig und beschränkt.

Anwendung: Differenzierbarkeit

Definition

Sei Z ein zentrierter Gauß-Prozess. Sei $t \in \mathbb{R}^d$ beliebig und seien k Richtungen $t'_1, \dots, t'_k \in \mathbb{R}^d$ gegeben, $t' = (t'_1, \dots, t'_k)$. Z hat **im Punkt t eine partielle Ableitung der Ordnung k in Richtung t'** (im L^2 -Sinn), wenn folgender Grenzwert im L^2 -Sinn existiert:

$$D_{L^2}^k Z(t, t') := \lim_{h_1, \dots, h_k \rightarrow 0} \frac{1}{\prod_{i=1}^k h_i} F \left(t, \sum_{i=1}^k h_i t'_i \right)$$

wobei $F(t, t') := \sum_{s \in \{0,1\}^k} (-1)^{k - \sum_{i=1}^k s_i} Z \left(t + \sum_{i=1}^k s_i t'_i \right)$ die symmetrische Differenz ist.

Anwendung: Differenzierbarkeit

Konstruktion

$$\|(\mathbf{s}, \mathbf{s}')\|_{d,k} := |\mathbf{s}| + \|\mathbf{s}'\|_{\otimes^k \mathbb{R}^d} = |\mathbf{s}| + \sqrt{\sum_{i=1}^k |\mathbf{s}'_i|^2}$$

$$T_{k,\rho} := T \times \{\mathbf{t}' \in \otimes^k \mathbb{R}^d : \|\mathbf{t}'\|_{\otimes^k \mathbb{R}^d} \in (1 - \rho, 1 + \rho)\}$$

und sei $B_{d,k}(y, h)$ die Kugel um $y = (t, t')$ mit Radius h unter $\|\cdot\|_{d,k}$.

Bemerkung

Wenn Z ein Gauß-Prozess ist, dann ist seine Ableitung im L^2 ebenfalls ein Gauß-Prozess, falls sie existiert.

Anwendung: Differenzierbarkeit

Theorem

Sei Z ein zentrierter Gauß-Prozess, T offen und beschränkt, alle partiellen Ableitungen k -ter Ordnung mögen im L^2 -Sinn existieren. Weiterhin soll ein K mit $0 < K < \infty$ und $\rho, \delta, h_0 > 0$ existieren, sodass für $0 < \eta_1, \eta_2, h < h_0$ gilt:

$$E \left((F(t, \eta_1 t') - F(s, \eta_2 s'))^2 \right) < \frac{K}{\left(-\log(\|(t, t') - (s, s')\|_{d,k} + |\eta_1 - \eta_2|) \right)^{1+\delta}}$$

für alle $((t, t'), (s, s')) \in T_{k,\rho} \times T_{k,\rho} : (s, s') \in B_{d,k}((t, t'), h)$.

Dann ist $Z \in C^k(T)$ mit Wahrscheinlichkeit 1.

Inhalt

Einleitung

Zufallsfeld

Gauß-Prozess

Stetigkeit, Beschränktheit und Differenzierbarkeit

Ziel

Vorbereitung

Hauptaussagen

Simulation

Wiederholung

Unbedingte Simulation

Bedingte Simulation

Wahl von n

Zusammenfassung

Wiederholung

Definition

Sei Z ein zufälliger Prozess auf $\mathbb{R}^d$.

Z heißt **stationär zweiter Ordnung**, wenn gilt:

- ▶ $E\{Z(t)\} = m < \infty, \forall t \in \mathbb{R}^d$
- ▶ $\text{Cov}\{Z(s), Z(t)\} = C(s - t) < \infty, s, t \in \mathbb{R}^d$

Die Funktion C heißt Kovarianzfunktion von $Z(t)$.

Wiederholung

Zentraler Grenzwertsatz (ZGWS)

Sei $Y_1, \dots, Y_n$ eine Folge von i.i.d. Zufallsvariablen mit $E(Y_i) = m < \infty$ und $\text{Var}(Y_i) = \sigma^2 < \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} - m < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} y \right) = \Phi(y)$$

wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Unbedingte Simulation

Voraussetzungen:

- ▶ Z habe Kovarianzfunktion C
- ▶ Z stationär zweiter Ordnung
- ▶ Z Gauß-Prozess mit

$$m(t) = E(Z(t)) \equiv 0$$

und

$$\text{Var}(Z) := C(0) = 1$$

- ▶ $T \subset \mathbb{R}^d$ zusammenhängend

Aufgabenstellung

Simulation von Z auf T

Lösungsansatz

- ▶ Simuliere $\{Z_i\}_{i=1,\dots,n}$, wobei Z_i unabhängige stationäre Prozesse mit Kovarianzfunktion C .
- ▶ Nach ZGWS für n genügend groß:

$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Z_i$ ist näherungsweise Gauß-Prozess.

Probleme:

- ▶ Simulation der Z_i
- ▶ Wahl von n

Verfahren:

- ▶ Spektralmethode
- ▶ Turning Bands
- ▶ Dilution

Spektralmethode

- ▶ Bekannt: Kovarianzfunktion C ist immer positiv semidefinit
- ▶ Annahme: C stetig
- ▶ Satz von Bochner: C ist Fouriertransformation eines endlichen Maßes χ :

$$C(h) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle h, u \rangle} d\chi(u)$$

- ▶ Da $C(0) = 1 \Rightarrow \chi$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß
- ▶ χ heißt Spektralmaß

Spektralmethode

Sei

- ▶ V Zufallsvektor, $V \sim \chi$
- ▶ U auf $(0, 1)$ gleichverteilte Zufallsvariable
- ▶ V, U unabhängig

Unter diesen Voraussetzungen ist

$$Z(t) = \sqrt{2} \cos(\langle V, t \rangle + 2\pi U)$$

ein Stochastischer Prozess mit $E(Z) = 0$, $\text{Var}(Z) = 1$ und Kovarianzfunktion C .

Spektralmethode

Bestimmung von χ

Sei C integrierbar

$\Rightarrow \chi$ hat eine Dichte f .

$\Rightarrow$ Zusammenhang zwischen f und C :

$$f(u) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle u, h \rangle} C(h) dh$$

Spektralmethode

Algorithmus: Spektralmethode

1. Erzeuge $V_1, \dots, V_n \sim \chi, U_1, \dots, U_n \sim U(0, 1)$
2. Berechne $Z^{(n)} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \cos(\langle V_k, t \rangle + 2\pi U_k), \forall t \in T$

Bemerkung

$Z^{(n)}$ ist näherungsweise ein Gauß-Prozess mit der gewünschten Kovarianzfunktion, wenn n genügend groß.

Spektralmethode: Beispiel

Sei $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{a}\right)$, die Exponentielle Kovarianzfunktion

Dann gilt:

$$f(u) = \frac{\Gamma(\mu)}{\pi^\mu} \frac{a^d}{(1 + a^2|u|^2)^\mu}$$

mit $\mu = \frac{d+1}{2}$.

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 1$ für $T \subset \mathbb{R}$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{2}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 2$ für $T \subset \mathbb{R}$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{2}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 4$ für $T \subset \mathbb{R}$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{2}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 8$ für $T \subset \mathbb{R}$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{2}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 64$ für $T \subset \mathbb{R}$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{2}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 2$ für $T \subset \mathbb{R}^2$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{\pi}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 4$ für $T \subset \mathbb{R}^2$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{\pi}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 8$ für $T \subset \mathbb{R}^2$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{\pi}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 32$ für $T \subset \mathbb{R}^2$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{\pi}\right)$

Spektralmethode: Simulation einer Realisierung

Abbildung: Simulation mit $n = 256$ für $T \subset \mathbb{R}^2$, $C(h) = \exp\left(-\frac{|h|}{\pi}\right)$

Turning Bands

- ▶ Approximiere Z durch n eindimensionale stochastische Prozesse Z_j in verschiedenen Richtungen.
- ▶ Bei richtiger Wahl der Kovarianzfunktionen für die Z_j und geeigneten Richtungen ist die Summe dieser Prozesse näherungsweise ein Gauß-Prozess.

Dilution: Idee

- ▶ Simuliere einen homogenen Poisson-Prozess auf $\mathbb{R}^d$ mit geeigneter Intensität.
- ▶ „Ergänze“ die simulierten Punkte um eine bestimmte Menge.
- ▶ Addiere für alle darin enthaltenen t mit Wahrscheinlichkeit 0.5 eine 1 oder -1 zu dem bisher simulierten $Z(t)$ (initialisiert mit 0).
- ▶ Nach dem ZGWS konvergiert dies gegen einen Gauß-Prozess.

Dilution: Vorgehen

Sei C darstellbar als $C(h) = \theta \cdot \mathbf{E}\{|A \cap A_h|\}$, wobei

- ▶ $A \subset \mathbb{R}^d$ eine zufällige kompakte Menge
- ▶ $A_h := \{a + h, a \in A\}$
- ▶ θ ein Proportionalitätsfaktor

Dann ist

$$Z(t) = \sum_{x \in X} \varepsilon(x) 1_{t \in A_x}, \quad t \in T$$

ein Gauß-Prozess mit obiger Kovarianzfunktion, wobei

- ▶ X homogener Poisson-Prozess in $\mathbb{R}^d$ mit Intensität θ
- ▶ $\forall x \in X: \varepsilon(x) \in \{-1, 1\}$ mit $P(\varepsilon(x) = 1) = \frac{1}{2}$

Bedingte Simulation

Es gelte:

- ▶ Sei Z Gauß-Prozess auf $\mathbb{R}^d$
- ▶ $E(Z) = 0$, $\text{Var}(Z) = 1$
- ▶ Z habe Kovarianzfunktion C

Aufgabenstellung

Simuliere Z , sodass gilt:

$$Z(b) = z(b), \quad \forall b \in B \subset \mathbb{R}^d, B \text{ endlich}$$

Bedingte Simulation

Definition

Der **Kriging-Schätzer** $Z^*(t)$ von $Z(t)$ für die gegebenen $Z(b)$, $b \in B$, ist die Linearkombination, sodass

$$Z^*(t) = \sum_{b \in B} \lambda_b(t) Z(b)$$

den mittleren quadratischen Fehler

$$\varepsilon(t) = E(Z^*(t) - Z(t))^2$$

minimiert.

Bedingte Simulation: Algorithmus

Algorithmus

1. Berechne die Schätzer

$$z^*(t) = \sum_b \lambda_b(t) z(b), \forall t \in T$$

2. Simuliere einen Gauß-Prozess mit Erwartungswert 0 und Kovarianzfunktion C , sei y diese Realisierung.
3. Berechne die Schätzer

$$y^*(t) = \sum_b \lambda_b(t) y(b), \forall t \in T$$

4. Setze $Z(t) = z^*(t) + y(t) - y^*(t), \forall t \in T$

Bedingte Simulation: Algorithmus

Ist $b \in B$ dann folgt:

$$z^*(b) = z(b), \quad y^*(b) = y(b)$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned} Z(b) &= z^*(b) + y(b) - y^*(b) \\ &= z(b) + y(b) - y(b) \\ &= z(b) \end{aligned}$$

Bedingte Simulation: Algorithmus

Sei $t \in T$ und $t \notin B$:

Simulation sollte nicht von den Daten beeinflusst werden.

Da gilt:

$$z^*(t) \approx 0, \quad y^*(t) \approx 0$$

folgt:

$$\begin{aligned} Z(t) &= z^*(t) + y(t) - y^*(t) \\ &\approx 0 + y(t) - 0 \\ &= y(t) \end{aligned}$$

Wahl von n

Sei n fixiert.

Wie „nah“ kommt die Verteilung von

$$Z^{(n)} = \frac{Z_1 + \dots + Z_n}{\sqrt{n}}$$

der Verteilung einer Standardnormalverteilung?

Wahl von n

Das heißt:

Sei

- ▶ $t_1, \dots, t_p \in T$
- ▶ $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$
- ▶ $F^{(n)}$ die Verteilung von $\sum_{j=1}^p \lambda_j Z^{(n)}(t_j)$.
- ▶ F die Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz $\sigma^2 = \sum_{j,k=1}^p \lambda_j \lambda_k C(t_j - t_k)$

Wie groß ist der Abstand der Verteilung $F^{(n)}$ zu F ?

Wahl von n

Die Abstandsmethode

- ▶ Berechne den Abstand $d(F^{(n)}, F)$ von $F^{(n)}$ und F .
- ▶ Stoppe, wenn d kleiner als ein kritischer Wert.
- ▶ Beispiel für d : Kolmogorow-Abstand:

$$d_k(F^{(n)}, F) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |F^{(n)}(y) - F(y)|$$

Wahl von n

Die Momentenmethode

- ▶ Vergleiche die Momente von $F^{(n)}$ und F .
- ▶ Stoppe, wenn Differenz der 4. Momente unter einem kritischen Wert.

Inhalt

Einleitung

Zufallsfeld

Gauß-Prozess

Stetigkeit, Beschränktheit und Differenzierbarkeit

Ziel

Vorbereitung

Hauptaussagen

Simulation

Wiederholung

Unbedingte Simulation

Bedingte Simulation

Wahl von n

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- ▶ Unter gewissen Voraussetzungen, im Wesentlichen über die Entropie der Indexmenge T , erhalten wir gleichzeitig die Stetigkeit und Beschränktheit eines Gauß-Prozesses.
- ▶ Eine Bedingung für die Differenzierbarkeit lässt sich über die Wahl eines speziellen T und passender Metrik herleiten.
- ▶ Für die Simulation spielt der zentrale Grenzwertsatz eine wichtige Rolle, da bei richtiger Normierung Folgen von i.i.d. stochastischen Prozessen gegen einen Gauß-Prozess konvergieren.

Literatur

R. Adler und J. Taylor

Random Fields And Geometry

Springer, New York, 2007

C. Lantuéjoul

Geostatistical Simulation - Models And Algorithms

Springer, Berlin, 2002