



Institut für Theoretische Chemie:
Prof. Dr. Gerhard Taubmann, M.Sc. Anja Kobel

Mathematik I für Chemie und Wirtschaftschemie

Die Übungsblätter können von <http://www.uni-ulm.de/theochem/lehre> heruntergeladen werden.

Übungsblatt 10, verteilt am 22.12.2010, Übung am 11.01.2011

Aufgabe 1:

Gegeben ist eine komplexe Zahl $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Geben Sie an: (6 P.)

- (a) $\operatorname{Re}(\operatorname{Re}(z))$
- (b) $\operatorname{Re}(\operatorname{Im}(z))$
- (c) $\operatorname{Im}(\operatorname{Re}(z))$
- (d) $\operatorname{Im}(\operatorname{Im}(z))$

Welche Größen aus (a) bis (d) können Sie angeben, ohne z zu kennen? Begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 2:

Formen Sie den periodischen unendlichen Dezimalbruch $c = 0,\overline{387}$ in einen echten Bruch um. Das Endergebnis muß vollständig gekürzt sein! (6 P.)

Aufgabe 3:

Berechnen Sie (7 P.)

$$S = \sum_{n=0}^{11} \frac{2^{n-1}}{27}.$$

Das Ergebnis muß als vollständig gekürzter echter Bruch dargestellt werden.

Aufgabe 4:

Gegeben ist die Funktion (6 P.)

$$f(x) = \left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$$

Berechnen Sie den konstanten Term in $f(x)$.

Aufgabe 5:

Stellen Sie z in der Form $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) dar. (7 P.)

$$z = \frac{|e^{42i}| (1+i)^3}{(1-i) \left| \frac{13+7i}{(13+7i)^*} \right|}$$

Aufgabe 6:

Wieviele mögliche Reihenfolgen der Buchstaben von *ulmumulm* gibt es? (5 P.)

Aufgabe 7:

Vereinfachen Sie soweit wie möglich: (5 P.)

$$\frac{\binom{2n+1}{2n-1}}{\binom{2n+3}{2n}}$$

Aufgabe 8:

Schreiben Sie T in der Form $\sum_k c_k x^k$.

(8 P.)

$$T = \sum_{n=-2}^{50} (n^2 - n) x^{n+2} + \sum_{m=1}^{53} (m+1) x^{m-1}$$

Aufgabe 9:

Von zwei Vektoren \vec{a} und \vec{b} ist bekannt:

(6 P.)

$$\vec{a} \odot \vec{b} = 6\sqrt{3} \quad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ \sqrt{11} \end{pmatrix}$$

\vec{a} und \vec{b} schließen einen spitzen Winkel α ein (d. h. $0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Berechnen Sie α !