



Institut für Theoretische Chemie:  
Prof. Dr. Gerhard Taubmann, Daniela Künzel, Katrin Tonigold

## Mathematische Methoden III für Chemie und Wirtschaftschemie

Fr. 10:15 Uhr, H7, O25/346

Die Übungsblätter können von <http://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-theochemie/lehre> heruntergeladen werden.

### Übungsblatt 7, Übung am 10. 12. 2010

#### Aufgabe 1: Bereichsintegral

Berechnen Sie das Bereichsintegral

$$\iint xy \, dx \, dy$$

über das vom Kreis  $x^2 + y^2 = 4$  und der Hyperbel  $x \cdot y = 1$  eingeschlossene, im 1. Quadranten liegende Gebiet.

#### Aufgabe 2: Bereichsintegral

Berechnen Sie das Bereichsintegral

$$\iint (ab - xy) \, dx \, dy$$

über den ersten Quadranten der Ellipse mit den Halbachsen  $a$  und  $b$ .

#### Aufgabe 3: Volumenintegral

a) Berechnen Sie das Volumen des Raumstücks, welches den beiden Zylindern  $x^2 + y^2 = 1$  und  $x^2 + z^2 = 1$  gemeinsam ist.

b) Es sei  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ;

Berechnen Sie das Volumenintegral dieser Funktion in dem in Aufgabe a) angegebenen Raumstück.

#### Aufgabe 4: Linienintegral

Berechnen Sie die Kurvenintegrale folgender Funktionen, wobei die Kurve C entlang des Dreiecks von (0,0) nach (1,0) nach (0,1) und wieder zu (0,0) verläuft:

$$(a) \oint_C (x+y) \, ds \quad (b) \oint_C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot d\vec{s} \quad (c) \oint_C (x \, dx + y \, dy) \quad (d) \oint_C (xy \, dx + x \, dy) \quad (e) \oint_C (x+y) \, dx$$

Geben Sie zuerst die Parametrisierung des Weges an: Wie lauten  $\vec{\gamma}_1(t)$ ,  $\vec{\gamma}_2(t)$ ,  $\vec{\gamma}_3(t)$ ? Hinweis:

- Es sei  $\vec{\gamma}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  der mittels  $t \in [a, b]$  parametrisierte Ortsvektor eines stückweise stetig differenzierbaren Weges der vom Anfangspunkt  $\vec{\gamma}(a)$  bis zum Endpunkt  $\vec{\gamma}(b)$  führt.
- Kurvenintegral 1. Art (die Funktion  $f$  ist eine Zahl, kein Vektor):  $\int_a^b f \, ds := \int_a^b f(\vec{\gamma}(t)) |\dot{\vec{\gamma}}(t)| \, dt$ .
- Kurvenintegral 2. Art (nun ist  $\vec{f}$  ein Vektor):  $\int_a^b \vec{f} \cdot d\vec{s} := \int_a^b \vec{f}(\vec{\gamma}(t)) \cdot \dot{\vec{\gamma}}(t) \, dt$ .
- Neben diesen Integralen gibt es noch solche, die nicht an der direkten Fläche unter der Funktion entlang des Weges interessiert sind, sondern nur an der Projektion dieser Fläche auf eine der Ebenen, die von jeweils einer Koordinatenachse und der Funktionswertachse gebildet werden, z.B. an  $\int_C f(x, y) \, dx = \int_C f(x, y(x)) \, dx = \int_C f(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} \, dt$  oder an  $\int_C f(x(y), y) \, dy$ .

#### Aufgabe 5: Linienintegral

Berechnen Sie den Wert des Linienintegrals

$$\int [(2xy + x^2) \, dx + (x^2 + 8y^2) \, dy]$$

von  $(-a, 0)$  nach  $(+a, 0)$  über die obere Halbellipse mit den Achsen  $a$  und  $b$ .