



Grundvorlesung Theoretische Chemie – Quantenmechanik I Übungsblatt Nr. 4, 10.12.2019

Die Übungsblätter können heruntergeladen werden von

<http://www.uni-ulm.de/theochem/>

Die Aufgaben werden besprochen in dem Seminar am 19.12.2018

Aufgabe 9: Harmonischer Oszillator

Betrachten Sie einen eindimensionalen harmonischen Oszillator.

a) Benutzen Sie

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{ip}{m\omega} \right), \quad a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle,$$
$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{ip}{m\omega} \right), \quad a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle,$$

um $\langle m|x|n\rangle$, $\langle m|p|n\rangle$, $\langle m|\{x,p\}|n\rangle$, $\langle m|x^2|n\rangle$ and $\langle m|p^2|n\rangle$ zu berechnen.

b) Überprüfen Sie, dass das Virialtheorem

$$\left\langle \frac{p^2}{m} \right\rangle = \left\langle x \frac{d}{dx} V \right\rangle$$

für die Erwartungswerte der kinetischen und potentiellen Energie in Bezug auf Energieeigenzustände gilt. Dieses Theorem besagt, dass die kinetische und die potentielle Energie beim harmonischen Oszillator im Mittel gleich groß sind.

Aufgabe 10: Kohärente Zustände

Ein kohärenter Zustand eines eindimensionalen harmonischen Oszillators ist definiert als Eigenzustand des (nicht-hermiteschen) Vernichtungsoperators a :

$$a |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle,$$

wobei λ eine i. allg. komplexe Zahl ist.

a) Zeigen Sie, dass

$$|\lambda\rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} e^{\lambda a^\dagger} |0\rangle$$

ein normierter kohärenter Zustand ist, d.h. dass $a |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle$ und dass $\langle \lambda | \lambda \rangle = 1$.

Hinweis: Schreiben Sie $e^{\lambda a^\dagger}$ in der Reihendarstellung und zeigen Sie, dass dieser Zustand ein Eigenzustand des Vernichtungsoperators ist. Nutzen Sie dabei aus, dass

$$aa^{\dagger n} = a^{\dagger n} a + na^{\dagger n-1}.$$

b) Zeigen Sie, dass ein kohärenter Zustand auch erzeugt werden kann durch das Anwenden des Translationsoperators $e^{-\frac{ip_l}{\hbar}}$ auf den Grundzustand des harmonischen Operators für eine endliche Verschiebung l , wobei p der Impulsoperator ist.

Hinweis: Stellen sie p durch a und a^\dagger dar und verwenden Sie das Baker-Hausdorff-Lemma in der Form

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}, \text{ falls } [A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0.$$

bitte wenden!

Aufgabe 11: "Halber" Oszillator

Betrachten Sie ein Teilchen der Masse m , das sich in einem eindimensionalen Potentialtopf folgender Form befindet:

$$V = \begin{cases} \frac{1}{2}kx^2 & \text{for } x \geq 0 \\ \infty & \text{for } x < 0. \end{cases}$$

- a) Bestimmen Sie die Grundzustandsenergie.
- b) Was ist der Erwartungswert $\langle x^2 \rangle$ im Grundzustand?