Mathematik II für Chemie und Wirtschaftschemie (Bachelor)
Fr 10-11(12): O27/123, O25/151, O25/648, N24/131

Übungsblatt 10, verteilt: 27.06.2008, Übung 04.07.2008

Die Übungsblätter können von <http://www.uni-ulm.de/theochem/lehre> heruntergeladen werden

Aufgabe 1: DGL 2. Ordnung, in der y nicht vorkommt

Lösen Sie folgende DFG:

- a) $xy'' + y' = 0$
- b) $xy'' = y'$ $y(1) = 0$; $y'(1) = 2$
- c) $y''y' = 1$
- d) $y'' + y'tan(x) = tan(x)$ $y(0) = 1$; $y'(0) = 1$

Aufgabe 2: Anwendung: Schwingungen

Allgemeine Schwingungsgleichung: lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten: $m \cdot y'' + p \cdot y' + k \cdot y = F(t)$, wobei:

m : Masse; y'' : Beschleunigung; $F(t)$: äußere Kraft; $-p \cdot y'$: Reibungskraft; $-k \cdot y$: Rückstellkraft
 $\omega_0 = (k/m)^{1/2}$: Kreisfrequenz

a) Ungedämpfte freie Schwingungen: (keine äußere Kraft, keine Reibungskraft):

$$m \cdot y'' + k \cdot y = 0$$

In einem Experiment sei die Masse m um die Strecke $y(0) = y_0$ aus der Ruhelage ausgelenkt. Bestimmen Sie die Koeffizienten C_1 und C_2 der zugehörigen partikulären Lösungen: $y'(0) = v_0$; (i) $v_0 < 0$, (ii) $v_0 = 0$, (iii) $v_0 > 0$. Identifizieren Sie die verschiedenen Fälle mit den Kurven der Abbildung.

b) Gedämpfte freie Schwingungen: (keine äußere Kraft)

$$m \cdot y'' + p \cdot y' + k \cdot y = 0$$

Ähnlich wie bei (a), bestimmen Sie die Koeffizienten C_1 und C_2 der zugehörigen partikulären Lösung: $y'(0) = v_0 = 0$

c) Erzwungene Schwingungen, Resonanzfall: $\omega_z = \omega_0$

$$m \cdot y'' + p \cdot y' + k \cdot y = A \cdot \cos(\omega_0 t)$$

Erhalten Sie die allgemeine Lösung. Skizzieren Sie $y(t)$. Diskutieren Sie das Ergebnis.

Zusatzaufgabe: Anwendung Quantenchemie

Ein Elektron, das sich (eindimensional) innerhalb eines Kastens mit Wänden an $x=-d$ und $x=d$ bewegt, gehorcht einer Zustandsgleichung:

$$-\mu \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x)$$

Die Randbedingungen bestehen darin, daß $\psi(x)$ an den Kastenwänden den Wert 0 annehmen soll. Wie lauten Eigenwerte und Eigenfunktionen dieses Eigenwertproblems?